



Corrigé I
Ondes mécaniques progressives

1.2 N°16 p.33 : Onde mécanique le long d'un ressort

1/ Oui, la perturbation conserve sa forme

2/ Sens de l'onde : vers la droite (onde progressive)

Mouvement d'une spire : vibration longitudinale (onde longitudinale)



1.6 N°17 p.33 : Orage en randonnée

1/ $v = 340 \text{ m.s}^{-1}$

2/ Célérité : $v = \frac{d}{\tau} \Leftrightarrow d = v\tau$

Application numérique :

$$d = 340 \times 18 = 6,1 \cdot 10^3 \text{ m} = 6,1 \text{ km}$$

3/ Exercice 1.5 :

$$D = \frac{V_1 V_2}{V_1 - V_2} \tau = 6,1 \text{ km} \Rightarrow \text{Temps de propagation de l'onde lumineuse négligeable}$$

$$\Rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2,5 \cdot 10^{-5}} = 4,0 \cdot 10^4 \text{ Hz} = \boxed{40 \text{ kHz}}$$

3/ Temps de retard : $\tau = 6 \times 0,1 = 0,6 \text{ ms}$

$$v = \frac{D}{\tau} = \frac{0,90}{0,60 \times 10^{-3}} = \boxed{1,5 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1}}$$

4/a) Acétone : $v = \frac{0,90}{7,6 \times 0,10 \times 10^{-3}} = \boxed{1,2 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1}}$

b) Glycérol : $v = \frac{0,90}{4,7 \times 0,10 \times 10^{-3}} = \boxed{1,9 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1}}$

c) Kérosène : $v = \frac{0,90}{6,8 \times 0,10 \times 10^{-3}} = \boxed{1,3 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1}}$

5/ $\tau = \frac{D}{v} = \frac{0,90}{341} = 2,6 \text{ ms} \Rightarrow \boxed{26 \text{ divisions}}$

4/ $v = \frac{d}{\tau} = \frac{140 \times 10^{-2}}{85 \times 10^{-3}} = \boxed{16 \text{ m.s}^{-1}}$

1.4 N°26 p.35 : Perturbation le long d'une corde

1/ La perturbation d'un point du milieu à l'instant t' est identique à celle de la source à l'instant t , tel que :

$$t' = t + \tau$$

avec τ le temps de retard.

2/ a) Temps de retard :


$$t = t_1 + \tau_1 \Leftrightarrow \tau_1 = t - t_1$$

$$\tau_1 = 125 - 75 = 50 \text{ ms}$$

Distance parcourue par l'onde pendant ce temps :

1.8 N°28 p.35 : Salve d'ultrasons

1/



Sept divisions entre chaque début de salve, donc un temps de retard de :

$$\tau = 7 \times 0,1 = 0,7 \text{ ms}$$

Important : les deux signaux vus sur l'oscillogramme doivent correspondre à la même salve.

2/ $v = \frac{d}{\tau} = \frac{24 \cdot 10^{-2}}{0,7 \cdot 10^{-3}} = \boxed{3 \cdot 10^2 \text{ m.s}^{-1}}$

1.12 N°30 p.35 : Corde de piano et caténaire

1/ Perturbation dans un milieu matériel élastique, qui se propage sans déplacement net de matière.

Perturbation perpendiculaire à la direction de propagation, pour une onde transversale.

2/ $V = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ (toujours donnée)

3/ Volume de la corde, cylindrique :

$$\mathcal{V} = \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 \ell = 3,14 \times (0,500 \cdot 10^{-3})^2 \times 0,420$$


$$\mathcal{V} = 3,30 \cdot 10^{-7} \text{ m}^3$$

Masse de la corde : $\rho = \frac{m}{\mathcal{V}} \Leftrightarrow m = \rho \mathcal{V}$

$$v = \frac{d_1}{\tau_1} \Leftrightarrow d_1 = v\tau_1$$

$$d_1 = 12,0 \times 50 \cdot 10^{-3} = 0,60 \text{ m}$$

La perturbation était ainsi à 0,60 m :



2/ b) $t = t_2 + \tau_2 \Leftrightarrow \tau_2 = t - t_2$

$$\tau_2 = 200 - 125 = 75 \text{ ms}$$

$$v = \frac{d_2}{\tau_2} \Leftrightarrow d_2 = v\tau_2$$

$$d_2 = 12,0 \times 75 \cdot 10^{-3} = 0,90 \text{ m}$$

1.10 N°29 p.35 : Célérité dans les liquides

1/






Schéma :



2/



Quatre périodes par division :

$$T = \frac{0,1 \times 10^{-3}}{4} = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ s} = 25 \mu\text{s}$$

$$m = 7,89 \cdot 10^3 \times 3,30 \cdot 10^{-7} = 2,60 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

Masse linéique de la corde :

$$\mu = \frac{m}{\ell} = \frac{2,60 \cdot 10^{-3}}{0,420} = 6,20 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^{-1}$$

Célérité des ondes :

$$V_1 = \sqrt{\frac{843}{6,20 \cdot 10^{-3}}} = \boxed{369 \text{ m.s}^{-1}}$$

4/ $V_2 = \sqrt{\frac{26,0 \cdot 10^3}{1,40}} = \boxed{136 \text{ m.s}^{-1}}$

5/ $V_{\text{lim}} = 0,70 \times V_2 = 95,4 \text{ m.s}^{-1} = \boxed{343 \text{ km.h}^{-1}}$

6/ $V_3 = \sqrt{\frac{30,0 \cdot 10^3}{1,40}} = 146 \text{ m.s}^{-1} = \boxed{527 \text{ km.h}^{-1}}$